

Số: 16/BC7N-TTBVTV

Quảng Trị, ngày 17 tháng 4 năm 2024

## BÁO CÁO

### Tình hình sinh vật gây hại cây trồng

(Từ ngày 15 tháng 4 năm 2024 đến ngày 21 tháng 4 năm 2024)

#### I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ CÂY TRỒNG

##### 1. Thời tiết

Nhiệt độ trung bình: 29°C Cao nhất: 38°C Thấp nhất: 26°C

Độ ẩm trung bình: 80% Cao nhất: 85% Thấp nhất: 70%

Thời tiết trong kỳ ngày trời nắng, không mưa, sáng sớm có sương mù rải rác, trưa chiều nắng nóng.

##### 2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng

###### a) Cây lúa:

Vụ	Trà	Giai đoạn sinh trưởng	Diện tích gieo cấy (ha)	Diện tích thu hoạch (ha)
Đông Xuân 2023-2024	Sớm	Chín sấp – thu hoạch	1.500	30
	Chính vụ	Chín sữa – chín sấp	23.269	-
	Muộn	Trở – chín sữa	1.200	-
	Tổng		25.969	-

###### b) Cây trồng khác

Nhóm/ loại cây	Giai đoạn sinh trưởng	Diện tích gieo trồng (ha)
- Cây sắn	Phát triển thân lá	11.000
- Cây ngô	Trở cò, phun râu - PT bắp	3.500
- Cây lạc	PT quả	3.000
- Cây công nghiệp:		
Hồ tiêu	Phát triển quả	2.153,6
Cao su	Ra lá mới	18.800,7
Cà phê	Ra hoa - đậu quả	3.942,8

##### 3. Diện tích cây trồng bị ảnh hưởng của thiên tai trong kỳ: Không.

#### II. TÌNH HÌNH SVGH CHỦ YẾU

1. Trên cây lúa: Các đối tượng sâu bệnh hại chủ yếu gồm: Chuột DTN 400 ha (giảm 62 ha so với kỳ trước), tỷ lệ hại phổ biến 5-10%, nơi cao 20-22%; bệnh khô

vẫn DTN 626 ha (tăng 53 ha so với kỳ trước), tỷ lệ bệnh phổ biến 20-25%, nơi cao 40-45%; rầy các loại DTN 54 ha (tăng 27 ha so với kỳ trước), mật độ phổ biến 500-800 con/m<sup>2</sup>, nơi cao 3.000-4.000 con/m<sup>2</sup>; bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn DTN 52 ha (giảm 14 ha so với kỳ trước), tỷ lệ bệnh phổ biến 5-10%, nơi cao 15-20%; bệnh lem lép hạt DTN 120 ha, tỷ lệ bệnh phổ biến 5-10%. Ngoài ra bệnh đạo ôn cổ bông gây hại cục bộ một số vùng ở Gio Linh, Vĩnh Linh (DTN 4 ha).

**2. Trên cây ngô:** Sâu keo mùa thu DTN 18 ha, mật độ phổ biến 1-3 con/m<sup>2</sup>, nơi cao 5 con/m<sup>2</sup>.

**3. Trên cây hồ tiêu:** Tuyến trùng DTN 196 ha (giảm 10 ha so với kỳ trước), tỉ lệ bệnh phổ biến 5-10%, nơi cao 15-20%; bệnh chết chậm DTN 142 ha, tỉ lệ bệnh phổ biến 5-10%, nơi cao 15-20%; bệnh đốm lá DTN 81 ha, tỉ lệ bệnh phổ biến 5-10%, cao 15-20%; bệnh chết nhanh DTN 17 ha, tỉ lệ bệnh phổ biến 5-10%; bệnh thán thư DTN 135 ha (giảm 9 ha so với kỳ trước), tỉ lệ bệnh phổ biến 3-5%, nơi cao 15-20%; rệp sáp DTN 21 ha, tỉ lệ hại phổ biến 5-10%, nơi cao 15%.

**4. Trên cây cà phê:** Bệnh rỉ sắt DTN 551 ha (giảm 60 ha so với kỳ trước) trong đó hại nặng 40 ha, tỷ lệ bệnh phổ biến 10-30%, nơi cao 60%; rệp các loại DTN 130 ha, tỉ lệ hại phổ biến 10-25%, nơi cao 50%; bệnh khô cành DTN 785 ha trong đó hại nặng 80 ha, tỉ lệ bệnh phổ biến 10-15%, nơi cao 60-70%; bệnh thán thư DTN 605 ha trong đó hại nặng 60 ha, tỉ lệ bệnh phổ biến 15-20%, nơi cao 50%.

**5. Trên cây cao su:** Bệnh loét sọc mặt cạo DTN 275 ha trong đó nhiễm nặng 5 ha, tỉ lệ bệnh phổ biến 5-10%, nơi cao 30%; bệnh xì mủ DTN 151 ha, tỉ lệ bệnh phổ biến 5-10%, nơi cao 15%; bệnh phấn trắng DTN 502 ha, tỷ lệ bệnh phổ biến 10-15%, nơi cao 20-30%.

**6. Trên cây sắn:** Bệnh khảm lá virus DTN 930 ha (tăng 30 ha so với kỳ trước) trong đó nhiễm nặng 200 ha, tỷ lệ bệnh phổ biến 5-10%, nơi cao 30-40%, cục bộ có nơi 70-80%. Ngoài ra, bọ phấn, nhện đỏ phát sinh gây hại nhẹ một số vùng.

### **III. DỰ BÁO SVGH VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO PHÒNG TRỪ**

#### **1. Dự báo SVGH chủ yếu trong kỳ tới**

**1.1. Trên cây lúa:** Chuột tiếp tục gây hại nhiều nơi; bệnh khô vằn, bạc lá, đốm sọc vi khuẩn, lem lép hạt tiếp tục gây hại nặng dần về cuối vụ; rầy các loại tiếp tục gia tăng mật độ và diện tích nhiễm, có thể gây cháy cục bộ giai đoạn lúa chín sữa - chín sấp; bệnh đạo ôn cổ bông tiếp tục phát sinh gây hại, chú ý trên lúa trà muộn; nhện gié, bệnh lúa von, thối thân thối bẹ... khả năng phát sinh gây hại một số vùng.

**1.2. Trên cây ngô:** Sâu keo mùa thu tiếp tục gây hại các vùng gieo trồng muộn.

**1.3. Trên cây hồ tiêu:** Bệnh chết chậm, chết nhanh, thán thư... tiếp tục gây hại các vườn bị bệnh, vùng ổ dịch.

**1.4. Trên cây cà phê:** Các đối tượng dịch hại như: Bệnh khô cành, thán thư, rỉ sắt,... tiếp tục gây hại nhiều nơi, hại nặng trên các vườn cà phê già cỗi, các vườn không chú trọng công tác phòng trừ.

**1.5. Trên cây cao su:** Bệnh xì mủ, loét sọc mặt cạo tiếp tục gây hại trên các vườn; bệnh phấn trắng tiếp tục gây hại các vùng.

**1.6. Trên cây sắn:** Bệnh khảm lá virus tiếp tục lây lan gây hại, hại nặng

những vùng đã bị bệnh các năm trước; bộ phận, nhện đỏ tiếp tục phát sinh, gây hại nhiều nơi.

## **2. Đề xuất biện pháp chỉ đạo phòng trừ SVGH chủ yếu trong kỳ tới**

### **2.1. Trên cây lúa:**

- Khoanh vùng và kịp thời phun thuốc trừ rầy ngay ở những nơi có mật độ từ 750 con/m<sup>2</sup> trở lên bằng các loại thuốc có hoạt chất *Etofenprox*, *Pymetrozine*,... như Trebon10EC, Chess 50WG..., những diện tích dự kiến thu hoạch trước ngày 27/4 thì không phun thuốc trừ rầy mà thu hoạch ngay khi lúa chín sinh lý. Lưu ý: Khi phun phải đảm bảo lượng nước thuốc ít nhất 20 lít/500m<sup>2</sup> trở lên, rẽ lúa phun vào gốc lúa nơi rầy tập trung để đạt hiệu quả cao.

- Phun thuốc phòng bệnh đạo ôn cổ bông trước và sau khi lúa trổ 5-7 ngày bằng các loại thuốc có hoạt chất *Fenoxanil + Isoprothiolane*, *Propiconazole + Tricyclazole*, *Fenoxanil + Tricyclazole*, *Tricyclazole*,... như: Map Famy 35SC, Filia 525SE, Beam 75WP, Ninja 35EC,... Đặc biệt chú ý trên những vùng bị nhiễm đạo ôn lá chưa được phòng trừ hoặc phòng trừ chưa tốt, vùng ổ dịch, vùng gieo trồng giống nhiễm, vùng ruộng gieo dày, bón thừa đạm...

- Kiểm tra và phun thuốc phòng trừ bệnh khô vằn để hạn chế bệnh lây lan ra diện rộng bằng các loại thuốc có hoạt chất *Validamycin A*, *Hexaconazole* như Validan, Vivadamy, Anvil... Có thể sử dụng các loại thuốc phổ rộng có hoạt chất *Hexaconazole + Tricyclazole*, *Azoxystrobin + Difenoconazole*, *Difenoconazole + Propiconazole*,... như Newtec, Amistar Top... để phòng trừ nhóm bệnh đạo ôn cổ bông, lem lép hạt, khô vằn.

- Tăng cường diệt chuột bằng nhiều biện pháp để hạn chế chuột gây hại, ưu tiên các biện pháp thủ công (*Tuyệt đối nghiêm cấm dùng biện pháp kích điện để diệt chuột*).

Chú ý: Không nên phun thuốc khi lúa đang phơi màu; tuân thủ thời gian cách ly của từng loại thuốc để đảm bảo an toàn cho nông sản.

**2.2. Trên cây ngô:** Những nơi sâu keo mùa Thu đang gây hại sử dụng các loại thuốc có hoạt chất *Bacillus Thuringiensis*, *Spinetoram*, *Indoxacarb*, *Lufenuron*, *Emamectin benzoate*... như: Bitadin WP, Map - Biti WP 50000 IU/mg, Radiant 60SC, Map wing 45WP, Amater 150SC, Indocar 150SC, Angun 5WG, Proclaim 1.9EC,... để phun trừ khi sâu đa số tuổi 1-2, phun vào sáng sớm hoặc chiều mát, phun 2 lần cách nhau 10-12 ngày, phun ướt đều 2 mặt lá, nách lá và nõn lá.

**2.3. Trên cây hồ tiêu:** Kiểm tra, xử lý thuốc phòng trừ tuyến trùng, rệp sáp, bệnh chết chậm, chết nhanh... Đối với bệnh chết nhanh cần thu gom tàn dư cây bị bệnh mang ra khỏi khu vực vườn và đốt tiêu hủy, xử lý đất tại các gốc tiêu bị bệnh bằng vôi bột, tăng cường sử dụng các loại chế phẩm sinh học để phòng bệnh.

**2.4. Trên cây cà phê:** Tiến hành chăm sóc, bón phân đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng để tăng tỷ lệ ra hoa - đậu quả; xử lý thuốc phòng trừ sâu bệnh ở những vườn bị gây hại nặng.

**2.5. Trên cây cao su:** Kiểm tra vườn thường xuyên, phát hiện và xử lý cây bị bệnh xì mũ, loét sọc mặt cạo. Tiến hành bôi thuốc trên miệng cạo và vết xì mũ bằng

các loại thuốc đặc hiệu để tránh lây lan nhiều nơi. Phun thuốc phòng trừ bệnh phấn trắng không để bệnh gây hại nặng.

**2.6. Trên cây sắn:** Điều tra, khoanh vùng bị nhiễm bệnh khảm lá virus, tập trung diệt trừ bọ phấn môi giới, xử lý cây bị bệnh không để lây lan ra diện rộng. Tăng cường bón phân và phun phân bón lá để tạo điều kiện cho cây phát triển. Điều tra theo dõi các đối tượng sâu, bệnh khác như rệp sáp bột hồng, nhện đỏ, bệnh chổi rồng... để có biện pháp xử lý hiệu quả./.

***Nơi nhận:***

- Trung tâm BVTV vùng khu 4 (B/c);
- Sở NN & PTNT Quảng Trị (B/c);
- Trung tâm Khuyến nông;
- Chi cục trưởng, các PCCT;
- Phòng NN & PTNT, Kinh tế các huyện, thành phố, thị xã;
- Trạm TT&BVTV các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, P.BVTV.

**KT. CHI CỤC TRƯỞNG  
PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG**

**Trần Minh Tuấn**

**TỔNG HỢP DIỆN TÍCH NHIỄM SVGH CHỦ YẾU TRÊN CÂY TRỒNG CHỦ LỰC TRONG KỲ**

STT	Tên SVGH	Mật độ sâu (con/m <sup>2</sup> ), tỉ lệ bệnh (%)			Tuổi sâu, cấp bệnh phổ biến	DTN các loại dịch hại (ha)					So sánh diện tích nhiễm (+/- ha)		Diện tích phòng trừ (ha)	Phân bố
		Phổ biến	Nơi cao	Cục bộ		Tổng	Nhẹ	TB	Nặng	Mất trắng	Kỳ trước	Cùng kỳ năm trước		
I	Cây lúa (Trở - chín - thu hoạch)													
1	Chuột	5-10	20-22			400	273	110	17	0	-62	-62		Các huyện, thị, thành phố
2	Rầy các loại	500-800	3.000-4.000		3-5	54	35	16	3	0	+27	+29	54	H.Lăng
3	Bạc lá, đốm sọc vi khuẩn	5-10	15-20		1-3	52	49	3	0	0	-14	+22		H. Lăng, Tr. Phong, V. Linh
4	Khô vằn	20-25	40-45		3	626	435	175	16	0	+53	+12	1.000	Các huyện, thị, thành phố
5	Lem lép hạt	5-10			1	120	120	0	0	0	0	-92	4.000	Gio Linh
II	Cây ngô													
1	Sâu keo mùa thu	1-3	5		1-5	18	15	3	0	0	0	-44	0	Tr. Phong, C. Lộ
III	Cây hồ tiêu (Phát triển quả)													
1	Chết chậm	5-10	15-20		1-3	142	125	17	0	0	0	-8	150	Tr. Phong, V. Linh, G.Linh, C. Lộ
2	Chết nhanh	5-10			1	17	15	2	0	0	0	-6	0	V.Linh
3	Tuyển trùng	5-10	15-20		1	196	173	21	2	0	-10	-25	150	Tr. Phong, C. Lộ, G. Linh, V. Linh, H. Hóa
4	Thán thư	3-5	15-20		1-3	135	115	20	0	0	-9	-42	20	Tr. Phong, V. Linh, G.Linh, C. Lộ
5	Đốm lá	5-10	15-20		3	81	68	13	0	0	-2	-16	0	C. Lộ, G. Linh, H. Hóa
6	Rệp sáp	5-10	15		1-2	21	15	6	0	0	0	-28	0	Hướng Hóa
IV	Cây cà phê (Ra hoa - đậu quả)													
1	Khô cành	10-15	60-70		1	785	505	200	80	0	0	+50	40	Hướng Hóa
2	Thán thư	15-20	50		1-3	605	360	195	50	0	0	+55	40	
3	Rệp	10-25	50		1-3	130	75	45	10	0	0	-85	0	
4	Rỉ sắt	10-30	60		1	551	355	156	40	0	-60	+241	50	

STT	Tên SVGH	Mật độ sâu (con/m <sup>2</sup> ), tỉ lệ bệnh (%)			Tuổi sâu, cấp bệnh phổ biến	DTN các loại dịch hại (ha)					So sánh diện tích nhiễm (+/- ha)		Diện tích phòng trừ (ha)	Phân bố
		Phổ biến	Nơi cao	Cục bộ		Tổng	Nhẹ	TB	Nặng	Mất trắng	Kỳ trước	Cùng kỳ năm trước		
V	Cây cao su (Ra lá mới)													
1	Loét sọc mặt cạo	5-10	30		1-3	275	232	38	5	0	0	+95	235	C. Lộ, G.Linh, V. Linh
2	Xì mũ	5-10	15		1-3	151	134	17	0	0	+4	+26	10	Tr. Phong, C. Lộ, G.Linh, V. Linh
3	Phấn trắng	10-15	20-30		1-3	502	412	77	13	0	-5	-943	0	C. Lộ, G. Linh, V. Linh
VI	Cây sắn (Phát triển thân lá)													
1	Khảm lá virus	5-10	30-40	70-80		930	335	395	200	0	+30	+831	0	H. Lãng, TX. Quảng Trị, Tr. Phong, Gio Linh, V. Linh, Đakrông...